

Tartre, gingivite, maladie parodontale et détartrage :

De quoi s'agit-il ?


Tout commence avec la formation de la plaque dentaire qui se forme sous l'effet de différents facteurs (salive, alimentation, ..) La cavité buccale n'étant pas un milieu stérile, des bactéries se multiplient à sa surface provoquant sa minéralisation. C'est la calcification de cette plaque dentaire qui est appelée TARTRE.



Suite à la présence de ces bactéries et de ce tartre, la gencive s'enflamme provoquant ainsi une GINGIVITE.

Si la situation n'est pas maîtrisée à ce stade, la gencive se rétracte provoquant un déchaussement dentaire et la perte de la dent. C'est la MALADIE PARODONTALE. Elle est très répandue chez nos animaux domestiques. Elle augmente avec l'âge et diminue lorsque la taille de l'animal augmente. Les chiens de petite taille doivent, donc, en général être détartrés plus précocement que ceux de grande taille.





Outre, la mauvaise haleine qui peut en résulter, la perte des dents, la douleur (un animal qui se frotte le museau ou se soustrait avec agressivité quand on lui touche la face), la difficulté à mastiquer les aliments (une préférence pour les aliments humides est notée), une baisse de l'appétit voire même de l'anorexie et une salivation excessive avec parfois la présence de sang, la maladie parodontale augmente le risque d'insulino-résistance chez les animaux diabétiques et pourrait avoir des conséquences cardiovasculaires. La présence d'un de ces symptômes devrait donc amener le propriétaire à consulter son vétérinaire.

Que faire ?

Le traitement de choix pour enlever le tartre est le DETARTRAGE. Pour se faire, votre animal devra être anesthésié car l'intervention nécessite une tête immobile et une gueule bien ouverte difficilement obtenue sur un animal vigile. Une fois endormi, le vétérinaire enlèvera le tartre au moyen d'un appareil à ultra-sons semblable à celui utilisé par votre dentiste. Les dents dont la gencive s'est rétractée et qui, par ce fait, sont déchaussées seront enlevées pour éviter toute gêne. C'est à ce stade que beaucoup de propriétaire hésitent à faire détartrer leur animal de peur de le retrouver édenté. Ce qu'il faut savoir c'est que les dents sont enlevées quand elles présentent une mobilité (c-à-d qu'elles ne tiennent plus) suite au déchaussement dentaire provoqué par le tartre. **Moralité : plus on attend pour un détartrage, plus on risque d'y laisser des dents.** Pour terminer, un polissage des dents permettra de ralentir la réapparition du tartre en diminuant l'adhésion de la plaque dentaire sans jamais l'en empêcher définitivement.



avant | après

A quelle fréquence dois-je effectuer un détartrage ?

Il n'y a pas de fréquence idéale pour un détartrage. Le dépôt de tartre dépend d'une série de facteurs :

- de l'animal (de sa race, sa sensibilité individuelle, ...)
- d'une anomalie dentaire (malocclusion, dents de laits persistantes, ...)
- de l'existence et de l'observance de soins de prévention (croquettes, brossage,)

Certains chiens ont donc besoin d'un détartrage annuel et d'autres d'un tous les 2-3 ans. C'est pourquoi l'inspection de la cavité buccale, lors de la consultation vaccinale annuelle, est si importante.

Nous ne le répèterons jamais assez, le tartre reviendra inévitablement à plus au moins long terme. Que faire pour limiter cela ?

Plusieurs moyens existent :

1) Vous pouvez **BROSSER** les dents de votre chien. Cela n'est pas toujours facile, même si les dentifrices ont un goût de poulet, mieux vaut habituer son animal dès son jeune âge.

Regardez la démonstration vidéo à l'adresse suivante :
<https://www.youtube.com/watch?v=r0f1D1Ha8g4>



2) Des SOLUTIONS DENTAIRES à diluer dans le bol d'eau de votre animal ou des compléments alimentaires visant à diminuer la récurrence de la plaque dentaire existent également.

3) Les LAMELLES A MACHER seront sans doute très appréciées par votre chien mais se révèlent parfois peu efficaces. En effet, leur mode d'action est décrit dans leur nom. Elles doivent être mâchées et mastiquées pendant un certain temps pour nettoyer les dents, ce qui est difficilement réalisable vu la rapidité avec laquelle les chiens de grandes races les avalent.

Pour ces derniers, vous pouvez leur donner des OS. **Attention pas n'importe lesquels !** En effet, les os de poulet sont trop petits et trop pointus. Ils pourraient être responsables de perforations oesophagiennes ou intestinales. De même, les os trop friables peuvent être avalés en gros morceaux et provoquer une obstruction intestinale. Mieux vaut éviter cela et opter pour les gros os à moelle. Leur seul inconvénient peut être une tendance à la constipation. Les os en peau de bœuf peuvent être utilisés mais leur composition semble, d'après certains articles, à discuter.



Les JOUETS DENTAIRES peuvent être une alternative intéressante dans ce cas.



4) Enfin, les CROQUETTES de part leur mastication permettent une meilleure élimination de la plaque dentaire que les pâtées. Certaines croquettes sont même spécialement conçues pour cela et peuvent, par leurs grandes tailles et leurs actions abrasives sur les dents, être d'une certaine efficacité.



En conclusion :

La santé bucco-dentaire de votre animal n'est pas à négliger. Elle peut-être responsable ou aggraver certaines pathologies existantes. Un simple détartrage effectué à temps peut permettre à votre compagnon de garder toutes ses dents. Plusieurs solutions existent pour diminuer l'apparition du tartre et votre vétérinaire se fera un plaisir de vous conseiller au mieux.